

Ormbett

Under vår och sommar lockar solen fram ormarna ur sina gömställen. Huggormsbett kan vara farligt för hundar och katter i Sverige. Giftet som ormen använder skadar hundens/kattens mjukdelsvävnad, orsakar en kraftig svullnad, samt skadar olika inre organ (njure, lever) och röda blodkroppar genom spridning via blodcirkulationen.

Symtom efter ormbett kan vara alltifrån ganska lindriga till mycket allvarliga, och det går aldrig att säga i förväg hur mycket djuret kommer att bli påverkad.

Ett djur som blivit huggormsbitet kan bli slö och trött. En kraftig svullnad uppstår vanligtvis i bettområdet. Vissa hundar/katter kan börja kräkas eller få diarré. Ibland kan djuret även hamna i chocktillstånd, en mycket allvarlig och livshotande situation som kräver direkt och intensiv behandling. Symtom på chock är bland annat bleka slemhinnor (t.ex. tandkött), apati, svag puls, svag andning.

Har du sett eller misstänker du att ditt djur har blivit bitet ska du göra så här:

- Håll djuret så stilla som möjligt, framför allt om det blev bitet i tassens, för att minska spridningen av giftet.
- Åk till veterinär direkt.
- OBS, man har INTE längre tid på sig för att åka till veterinär om djuret har fått kortison! Oavsett hur påverkad hunden/katten verkar vara, eller om den fick kortison eller inte – åk in till en veterinär genast!

Oavsett hur djuret behandlades bör man ta ett blodprov ca 1 vecka efter bittet för att kontrollera att njur- och leverfunktionen är som den ska.